



ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ (CADP) ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ



ຄູ່ມືວິຊາການ ກະສິກຳອິນຊີ (OA)

ນໍ້າລະລາຍຜົງຟູ (ໂຊດ້ຽມ ໄບຄາໂບເນດ)
(ກຳຈັດເຊື້ອ)





◆ ນ້ຳລະລາຍຝັງຟູ (ໂຊດ້ຽມ ໄບຄາໂບເນດ)
(ກຳຈັດເຊື້ອ)



◆ ນ້ຳລະລາຍຝັງຟູ

ນິຍາມ:

ນ້ຳລະລາຍຝັງຟູ ມີສ່ວນປະສົມ ນ້ຳກັບຝັງຟູ.

ນ້ຳລະລາຍຝັງຟູ ແມ່ນວິທີການກຳຈັດເຊື້ອຮາຢູ່ເທິງຜິວໃບ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ໂດຍການສີດໃສ່ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງໃບ. ເຊື້ອຮາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດ.

ວິທີນີ້ປອດໄພຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະນຸດ ແລະ ລະບົບນິເວດອື່ນໆ.



ພະຍາດເຊື້ອຮາແປ້ງ
(ໝາກອຶ)



ພະຍາດເຊື້ອຮາທີ່ເປັນສີເທົາ
(ໝາກແຕງ)



◆ ນ້ຳລະລາຍຝັງຟູ

ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະ ລະດູ ແລະ ຊະນິດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດ:

【ລະດູຝົນ】 :


- ສະພາບອາກາດທີ່ມີອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຶ້ນ ປານກາງ-ສູງ :
- ພະຍາດເຊື້ອຣາທີ່ເປັນສີເທົາ
- ພະຍາດເຊື້ອຣາແປ້ງ

【ລະດູແລ້ງ】 :

- ສະພາບອາກາດທີ່ມີອຸນຫະພູມ ປານກາງ-ສູງ ແລະ ຄວາມຊຶ້ນປານກາງ:
- ພະຍາດເຊື້ອຣາແປ້ງ



Erysiphaceae
(ພະຍາດເຊື້ອຣາແປ້ງ)



Botrytis cinerea
(ພະຍາດເຊື້ອຣາສີເທົາ)



◆ ນ້ຳລະລາຍຜົງຟູ

ນ້ຳລະລາຍຜົງຟູ ມີຄວາມສາມາດກຳຈັດເຊື້ອຣາໄດ້ດີ.

ນ້ຳລະລາຍຜົງຟູ ມີລັກສະນະຕິດຢູ່ເທິງຜິວຂອງໃບ ຈະເພີ່ມຄ່າ PH ເປັນ ດ່າງ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື້ອຣາບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນ ດ່າງ ສູງໄດ້. ເຊື້ອຣາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກກຳຈັດ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບພືດໄດ້.



Erysiphaceae
(ພະຍາດເຊື້ອຣາແປ້ງ)



Botrytis cinerea
(ພະຍາດເຊື້ອຣາທີ່ເປັນສີເທົາ)

◆ ນ້ຳລະລາຍຜົງຟູ



ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

1. ກະກຽມຜົງຟູ ແລະ ນ້ຳເຜິ້ງ.

ຕົ້ນທຶນ:

ລ/ດ	ວັດຖຸ	ປະລິມານ	ຕົວໜ່ວຍ	ລາຄາ (ກີບ)
1	ຜົງຟູ	300 g	1 ແພັກ	10,000
2	ນ້ຳເຜິ້ງ	360 g	1 ແກ້ວ	35,000
ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ				45,000



※ ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການນຳໃຊ້ ນ້ຳເຜິ້ງ ແມ່ນຄວາມໜຽວ
ເຮັດໃຫ້ຜົງຟູສາມາດເກາະຕິດໃບພືດໄດ້ດີ.

◆ ນໍ້າລະລາຍຜົງຟູ



ຕົ້ນທຶນຕົວຈິງ: ການພິມນໍ້າລະລາຍໃນປະລິມານ 20 ຄໍ (ໃນອັດຕາສ່ວນ 2,000 ເທື່ອ ຕໍ່ການພິມ 1 ຄັ້ງ)

ລ/ດ	ວັດຖຸ	ປະລິມານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຮູບພາບ	ລາຄາ (ກີບ)
1	ຜົງຟູ	10 g	1 ບ່ວງ		333
2	ນໍ້າເຜິ້ງ	10 ml	1 ຝາ		972
ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ					1,305

ຕົ້ນທຶນຕົວຈິງ: ການພິມນໍ້າລະລາຍໃນປະລິມານ 20 ຄໍ (ໃນອັດຕາສ່ວນ 1,000 ເທື່ອ ຕໍ່ການພິມ 1 ຄັ້ງ)



ລ/ດ	ວັດຖຸ	ປະລິມານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຮູບພາບ	ລາຄາ (ກີບ)
1	ຜົງຟູ	20 g	2 ບ່ວງ	 	667
2	ນໍ້າເຜິ້ງ	20 ml	2 ຝາ	 	1,944
ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ					2,611

◆ ນ້ຳລະລາຍຝຶງຟຸ

ນ້ຳ



ຝຶງຟຸ
(2,000 ເທື່ອ)



ນ້ຳເຜິ້ງ
(2,000 ເທື່ອ)



ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

2. ຂັ້ນຕອນທຳອິດ, ປະສົມລົງໃສ່ກັບນ້ຳ **ໃນອັດຕາສ່ວນ 2,000 ເທື່ອ.**

ອັດຕາສ່ວນຂອງ ນ້ຳລະລາຍເຈືອຈາງ
2,000 ເທື່ອ

ນ້ຳ	+	ຝຶງຟຸ	+	ນ້ຳເຜິ້ງ
50ℓ	+	25 g	+	25 mℓ
40 ℓ	+	20 g	+	20 mℓ
30ℓ	+	15 g	+	15 mℓ
20ℓ	+	10 g	+	10 mℓ
15ℓ	+	7.5 g	+	7.5 mℓ
10ℓ	+	5 g	+	5 mℓ
1ℓ	+	0.5 g	+	0.5 mℓ



ເຄື່ອງສີດນ້ຳຢາ ຖັງ 20 ℓ



(ຖ້າຫາກທ່ານນຳໃຊ້ ເຄື່ອງສີດນ້ຳຢາ ຖັງ 20 ℓ , ແມ່ນໃຫ້ເພີ່ມ ຝຶງຟຸ 10 g ແລະ ນ້ຳເຜິ້ງ 10 mℓ)

◆ ນ້ຳລະລາຍ ຝົງຟູ



ເຄື່ອງສີດນ້ຳຢາ ຖັງ 20 ລ



ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

3. ສີດນ້ຳຢາລົງໃສ່ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງໃບ ຂອງຕົ້ນພືດຕົ້ນດຽວ ເພື່ອເປັນການທົດສອບ. ແລ້ວກວດກາມື້ຕໍ່ມາວ່າ ມີອາການ ໃບໃໝ່ ຫຼື ບໍ່.
4. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີອາການ ໃບໃໝ່ ແມ່ນໃຫ້ສີດໃສ່ຕົ້ນພືດທີ່ເຫຼືອ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ອາການໃບໃໝ່ ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີສ່ວນປະສົມຂອງ ນ້ຳລະລາຍເຈືອຈາງສູງເກີນໄປ ເມື່ອເຮົາສີດນ້ຳຢາບາງຊະນິດ ໃສ່ໃບພືດ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນອິນຊີ, ຢາຂ້າເຊື້ອຣາ ເປັນຕົ້ນ

- ອາການໃບໃໝ່ ມັກເກີດຕັ້ງແຕ່ຂອບໃບ.
- ອາການໃບໃໝ່ ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ມື້ຕໍ່ມາ ຫຼື ມື້ຫຼັງຈາກມື້ຕໍ່ມາ.
- ຫຼີກລ້ຽງການສີດນ້ຳຢາໃນຕອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 10:00 A.M ~ 5:00 P.M.
- ການສີດນ້ຳຢາຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດອາການໃບໃໝ່ ໄດ້ດີກ່ວາ.



ຕົວຢ່າງ: ອາການໃບໃໝ່.



ນ້ຳ



ຜົງພູ
(1,000 ເທື່ອ)



ນ້ຳເຜິ້ງ
(1,000 ເທື່ອ)



◆ ນ້ຳລະລາຍຜົງພູ

ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

5. ຖ້າຫາກບໍ່ມີອາການ ໃບໃໝ່ ຫຼັງຈາກການສິດຄັ້ງທຳອິດ, ປະສົມນ້ຳໃນອັດຕາສ່ວນ 1,000 ເທື່ອ ຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

6. ຄຳແນະນຳ:

- ສິດອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ, ໃນມື້ທີ່ມີຂີ້ເຜີຍຫຼາຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ.



ເຄື່ອງສິດນ້ຳຢາ ຖັງ 20 ລ



ອັດຕາສ່ວນຂອງ ນ້ຳລະລາຍເຈືອຈາງ
2,000 ເທື່ອ

ນ້ຳ	+	ຜົງພູ	+	ນ້ຳເຜິ້ງ
50ລ	+	25 g	+	25 mລ
40 ລ	+	20 g	+	20 mລ
30ລ	+	15 g	+	15 mລ
20ລ	+	10 g	+	10 mລ
15ລ	+	7.5 g	+	7.5 mລ
10ລ	+	5 g	+	5 mລ
1ລ	+	0.5 g	+	0.5 mລ

ອັດຕາສ່ວນຂອງ ນ້ຳລະລາຍເຈືອຈາງ
1,000 ເທື່ອ

ນ້ຳ	+	ຜົງພູ	+	ນ້ຳເຜິ້ງ
50ລ	+	50 g	+	50 mລ
40 ລ	+	40 g	+	40 mລ
30ລ	+	30 g	+	30 mລ
20ລ	+	20 g	+	20 mລ
15ລ	+	15 g	+	15 mລ
10ລ	+	10 g	+	10 mລ
1ລ	+	1 g	+	1 mລ

ພາກສຸດທ້າຍ

“ນໍ້າລະລາຍຝົງຟູ” ແມ່ນເຕັກນິກ ວິທີການເຮັດຢາຂ້າເຊື້ອແບບອິນຊີ.

ຈາກການທົດລອງດ້ານວິທະຍາສາດ ໄດ້ມີຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນວ່າ ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທົດລອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຜ່ານສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ສູນຮ່ວມມືກະສິກໍາຂອງປະເທດຢື່ປຸ່ນ.

ໃນເຕັກນິກການປູກຝັງນີ້ ໄດ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ ໂຊດ້ຽມ ໄບຄາໂບເນດ ໃນໜ້າທີ 31 ສະບັບພາສາລາວ (ໜ້າທີ 78 ສະບັບພາສາອັງກິດ) ຂອງປຶ້ມ “ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ”. ອີງຕາມຄຳເຕືອນປະລິມານໃນການນຳໃຊ້ ໂຊດ້ຽມ ໄບຄາໂບເນດ ທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມື, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ໃນການນຳໃຊ້ຝົງຟູທີ່ ດ້ານປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳ, ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະນຸດ ແລະ ລະບົບນິເວດອື່ນໆ.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ ຈະແນະນຳ ຄູ່ມືເຕັກນິກການ ກະເສດໃນເຊິ່ງການປະຕິບັດເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນອິນຊີ ຂອງປະເທດລາວ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສາມາດ ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນລາວ ໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ.



ຂໍຂອບໃຈ ສຳລັບການຮັບຊົມ!

